



Estudo de Caso

GT 3 – “Os Rurais”

BALDIO DE SOUTO E OUTEIRO

LOCALIZAÇÃO DO BALDIO

- ✖ Freguesias de Telões e Gouvães da Serra;
- ✖ Concelho de Vila Pouca de Aguiar;
- ✖ Distrito de Vila Real.

CARACTERIZAÇÃO

- ✖ Situado entre os 700 e os 1210 m de altitude;
- ✖ Orientado maioritariamente a Norte, Este e Noroeste (cerca de 75%);
- ✖ Declive acentuado (em 60% do baldio é superior a 25%).

-
- ✘ Atravessado pela Ribeira do Souto a Norte e pela Ribeira do Suidro a Sul;
 - ✘ Faz parte do *Sítio Alvão-Marão*, integrando assim a Rede Natura 2000;
 - ✘ Usufruto comum entre os compartes das povoações de Souto e de Outeiro.

OCUPAÇÃO DO SOLO

- ✖ Área Total – 417,8 ha;
- ✖ Área de Incultos – 240,4 ha:
 - + Com aptidão florestal – 190,4 ha;
 - + Sem aptidão florestal – 50,0 ha.
- ✖ Área Agrícola – 4,4 ha;
- ✖ Área Florestal Arborizada – 173 ha:
 - + Resinosas – 155,4 ha;
 - + Folhosas – 8,4 ha;
 - + Mistos – 9,2 ha.

UTILIZAÇÃO DO BALDIO

✕ APROVEITAMENTO DE LENHA E DE MATO



✕ COGUMELOS



Boletus aereus



Macrolepiota procera

✕ SILVOPASTORÍCIA



✕ RESINAGEM



✕ CAÇA



✕ APICULTURA



✕ ACTIVIDADES DE RECREIO E LAZER



✕ ELEMENTOS SINGULARES



PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

- ✘ Existência de 3 pontos de água;
- ✘ Posto de vigia do Cabreiro (situado no perímetro envolvente ao baldio);
- ✘ Má conservação e distribuição dos acessos;
- ✘ Inexistência de aceiros ou corta – fogos.

RIQUEZA FAUNÍSTICA

✖ Lobo ibérico (*Canis lupus signatus*):



✖ Toupeira – de – água (*Galemys pyrenaica*):



✕ Lontra – europeia (*Lutra lutra*):



✖ Lagarto – de – água (*Lacerta schreiberi*):



✖ Salamandra – lusitânica (*Chioglossa lusitanica*):



✕ *Euphydryas aurinia*:



OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO



- ✕ Trabalho elaborado por:
- ✕ Manuel Brito
- ✕ Melissa Pinto
- ✕ Vítor Silva